

嘉義市政府 函

地址：嘉義市中山路199號
傳 真：2169926
聯 絡 人：黃千桂05-2254321#363
電子郵件：tina7335@yahoo.com.tw

受文者：嘉義市港坪國民小學

發文日期：中華民國109年1月14日
發文字號：府教體字第1091500696號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：消毒處理方式及注意事項.pdf (109ED01219_1_141608452051.pdf)

主旨：檢送「校園環境消毒與嘔吐物及排泄物消毒處理方式及注意事項」乙份，請各校（園）落實辦理病毒性腸胃炎衛生教育與防治工作，請查照。

說明：

- 一、腸胃炎係指胃、小腸或大腸的發炎，會導致病患嘔吐或腹瀉。有多種不同的病毒可導致病毒性腸胃炎，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。臺灣諾羅病毒及輪狀病毒主要流行季節為11月到隔年3月間，而腺病毒則全年都會發生。輪狀病毒、腺病毒、沙波病毒及星狀病毒好發於5歲以下兒童，輪狀病毒更是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因；而諾羅病毒則是任何年齡層皆可能受到感染。
- 二、諾羅病毒主要透過糞口途徑傳播，可能經由受病人排泄物或嘔吐物污染的水或食物、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染，常見出現噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛等症狀，症狀可持續1至10天。其傳播力極強，群聚事件易發生於學校或餐飲旅宿場所等人口密集機構，影響學童健康甚巨；「落實勤洗手，注意個人及環

境衛生」、「不生飲、生食，與他人共食應使用公筷母匙」、「罹病之餐飲從業人員避免從事食品調理工作」及「落實病患嘔吐物及排泄物污染場所消毒」等，是預防諾羅病毒傳播最重要的方法。

三、酒精對病毒性腸胃炎之防治效果不佳，請各校（園）平時即每週定期以含氯漂白水，進行教室環境消毒工作，消毒範圍包括教室課桌椅、地板、門把、樓梯、扶手、走廊地板、遊戲區等針對學童常接觸的地板擦拭消毒；若有病例或群聚出現請加強消毒頻率與強度。

四、附件之電子檔業公告於本府教育處全球資訊網-教育公告下載。

正本：本市各國民中小學(含嘉大附小)、本市各市立幼兒園、本市各私立幼兒園

副本：本府教育處特幼教育科、本府教育處體育保健科

